



TITLE:

自由:1 冷温帯林に生息スルニホンザルのカロリー及び各種栄養摂取量の季節変動(Ⅱ 共同利用研究 2.研究成果)

AUTHOR(S):

中川, 尚史

CITATION:

中川, 尚史. 自由:1 冷温帯林に生息スルニホンザルのカロリー及び各種栄養摂取量の季節変動(Ⅱ 共同利用研究 2.研究成果). 霊長類研究所年報 1993, 23: 75-75

ISSUE DATE:

1993-09-01

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/164452>

RIGHT:

在していることが示唆されると同時に、各々の種に定着しているものではないことが明かとなった。

計画：12-5

生体分子の構造分析による霊長類の系統

松島芳文

(埼玉県立がんセンター研究所・実験動物)

涙液と唾液のタンパク多型に関しては、すでにヒトおよび齧歯類について多くの報告がある。本研究では原猿から類人猿までの分類群をできるだけ広範囲に調査し、霊長類の涙液および唾液タンパク多型に関する全体的傾向を把握することを目的とする。霊長類の涙液および唾液に含まれる分泌性タンパクの多型現象をアクリルアミドゲル電気泳動法によって分析し、検出された遺伝標識によって、霊長類の系統関係について検討した。サル類22種49頭について涙液および唾液の採取を行い、泳動条件について種々の検討を行った。その結果、試料の採取方法、アクリルアミドゲル電気泳動法などが、齧歯類で行ってきたタンパク多型の検出方法の流用によって比較的簡便に解析できることがわかり、サル類の涙液および唾液タンパクは極めて多型性に富むことが明らかであった。しかし、同一種におけるサンプル数の少ないものについては電気泳動像の差異が、種差、個体差あるいは性差によるものか否かは、今後サンプル数の増加と同一個体における再現性、さらに血縁関係既知のニホンザル、アカゲザルなどの成績によって明らかにしたい。また、齧歯類にはX染色体に関連する涙液タンパクが発見されており、遺伝子配列の相同性 (synteny) が霊長類にどのように分布しているか、X染色体の不活化を裏づける左右眼での電気泳動的モザイク現象の発現が存在するかについても注目して解析を進めている。

B. 自由研究

自由：1

冷温帯林に生息するニホンザルのカロリー及び各種栄養摂取量の季節変動

中川尚史 (シオン短大・教養)

これまでニホンザルの食物環境の質は、秋・春・夏・冬の順に高いとされてきたが、これは各季節

の食物生産量に基づく予測であって、サルの食物摂取量を定量化した上での予測はなかった。

こうした状況の中で、冷温帯に属する宮城県金華山島の野性ニホンザルは、冬は秋に比べ、格段に少ない量のカロリー・蛋白質しか摂取できていず、冬は著しい食物不足に陥っていることが明らかになった (Nakagawa, 1989)。

本研究は、上記の研究と同じ手法を用い、金華山において残りの2つの季節、つまり春と夏のサルの食物摂取量の推定を試みたところ、次のようなことが明らかになった。

春のカロリー及び蛋白質摂取量は、それぞれ1290キロカロリー、68グラムで、秋におけるそれぞれの値の89%、190%を示した。つまり、カロリーに関しては大差なく、蛋白質はむしろかなり高めであった。他方、夏の摂取量は、それぞれ695キロカロリー、20グラムで、冬の125%、169%に過ぎず、冬同様深刻な食物不足であることが明らかになった。

このように確かに食物摂取量は、食物生産量から予測された通り、全体としては秋・春・夏・冬の順ではあったが、予想外に春の高さと夏の低さが目立つ結果となった。また、蛋白質については、春が秋に比べても、むしろかなり高めであった。

以上の結果は、春の食物摂取速度の高さと、夏の食物摂取速度の低さに由来していた。

自由：2

チンパンジーおよびヒト乳幼児における手使用の発達の分析

外岡利佳子 (名古屋大・教育心理)

乗越 皓司 (上智大・自然人類)

ヒト乳幼児とチンパンジーの手の機能的類似性および異質性を明らかにすることを目的に、飼育チンパンジー (1才~25才: 80頭) とヒト乳幼児 (2才~3才: 9名) を対象に、簡単なリーチング (視覚性到達運動) 課題における手使用の発達の比較をおこなった。地面 (ヒトでは机) にまんべんなくばらまかれたレーズンを被験体 (者) が拾う様子をビデオにより記録し、選択性 (どちらの手で) および操作性 (どのようにつまむか) に注目し分析をおこなった。その結果、以下のようなことがわかった。リーチングにおける手選択性は、ヒトでいわれているのと同様に、チンパンジー